

Список літератури

1. Сидерація як базова складова біологізації сучасних систем землеробства : Монографія / Я. Г. Цицюра та ін. Вінниця : ТОВ Друк, 2022. 770 с.
2. Сучасні методи в алелопатичних дослідженнях. Методичний посібник. За заг. ред. Н. В. Заїменко. Київ : Ліра-К, 2021. 200 с.
3. Mishchenko Y., Kovalenko I., Butenko A. Microbiological activity of soil under the influence of post-harvest siderates . Journal of Ecological Engineering. 2022. Vol. 23, №. 4. P. 122-127. <https://doi.org/10.12911/22998993/146612>
4. Singh J., Faull J. L. Antagonism and biological control. In Biocontrol of plant diseases. CRC Press, 2020. P. 167-177.
5. Wozniak A. Chemical properties and enzyme activity of soil as affected by tillage system and previous crop. Agriculture. 2019. 9(12). 262. <https://dx.doi.org/10.3390/agriculture9120262>

УДК 582.32 (477)

РІДКІСНІ МОХОПОДІБНІ УЖАНСЬКОГО НПП

Вірченко В. М.

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
E-mail: vir_chen_ko@ukr.net

Узагальнення літературних даних і результатів власних досліджень дало можливість виділити в бріофлорі Ужанського НПП шість видів, занесених до офіційних природоохоронних документів.

Види, занесені до Додатку I Бернської конвенції.

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. В Україні вид відомий з Карпат, Опілля та Криму. Для парку наводили угорські дослідники з окол. с. Загорб, г. Черемха [2].

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. В Україні трапляється в Карпатах, неморальній зоні, на Поліссі та Лісостепу. На території парку нами виявлений у таких пунктах: окол. с. Сіль, уроч. Підросульські води; окол. с. Жорнава, Жорнавський потік; окол. с. Кострина, потоки Яворний та Німецький; окол. с.

Стужиця, потік Тихий.

Види, занесені до Червоного списку МСОП.

Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray. В Україні був відомий із Закарпаття та Правобережного Полісся. На території парку знайдений І. С. Данилковим в уроч. Чертеж [1].

Brachythecium geheebii Milde – євразійський вид з основним поширенням у горах Європи. Для Українських Карпат цей мох відомий з п'яти пунктів Бескидів, Горган і Чорногори [2]. Нами виявлений у збірках з окол. с. Стужиця, схили г. Кременець; між потоками Суха Поточина і Гусарів; окол. с. Загорб, г. Черемха.

Види, занесені до Червоної книги України.

Plagiothecium neckeroideum Schimp. – гірський вид з диз'юнктивним євразійським поширенням. В Українських Карпатах відомий з Свидовця, Чорногори, Мармароських Альп. Для парку наводився І.С. Данилковим [1].

Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. Субсереземноморсько-субокеанічний вид. В Українських Карпатах був відомий з Бескидів, Горган, Чорногори і Чивчино-Гринявських гір [2]. В парку нами виявлений в буково-яворовому лісі між потоками Суха Поточина і Гусарів в окол. с. Стужиця.

Список літератури

1. Данилків І. С., Демків О. Т., Лобачевська О. В., Мамчур З. І. Мохоподібні Карпатського біосферного заповідника. Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Київ: Інтерекоцентр, 1997. С. 190-197.
2. Зеров Д. К., Партика Л. Я. Мохоподібні Українських Карпат. Київ: Наук. думка, 1975. 231 с.